


Borówka wysoka – program fertygacji ADOB®

pH roztworu w zakresie 5-5,5
EC: 0,5-1,4 mS/cm, zależnie od fazy wzrostu i przebiegu pogody
*Fertygacja 2-3 razy w tygodniu przy stężeniu 0,05% - 0,3% roztworu użytkowego



Dawka nawozu na tydzień*																			
Zbiornik A	ADOB Ferti NK + ME 15-5-15	10 kg/ha	10 kg/ha	10 kg/ha											10 kg/ha	10 kg/ha	10 kg/ha	10 kg/ha	
	ADOB Ferti P + ME 4-40-13	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha								5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	
	ADOB Ferti NPK 12-26-26				10 kg/ha	10 kg/ha	10 kg/ha												
	ADOB Ferti K + ME 10-6-39							15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	20 kg/ha	20 kg/ha	20 kg/ha				
Zbiornik B	ADOB siarczan Magnezu	10 kg/ha	10 kg/ha	10 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha												
	ADOB Calmag							5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha			
	ADOB Saletra wapniowa				5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha				
Faza rozwojowa																			
		start wegetacji	przed kwitnieniem		kwitnienie			rozwój owoców						zbiór owoców		po zbiorze owoców			
BBCH		10-11	55-59			60-69		71-79					87			91			
Tydzień od początku wegetacji		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Zbiornik A : ADOB Ferti, Siarczan magnezu | **Zbiornik B** : Saletra wapniowa, Calmag
Nie należy mieszać nawozów w zbiorniku **A** z nawozami ze zbiornika **B** w jednym zabiegu

Dawki orientacyjne, należy dostosować do zasobności gleby, przebiegu pogody i odmiany

ADOB Siarczan magnezu: MgO - 16 | SO₃ - 32,5

ADOB Calmag: N - 13,5 (N-NO₃ - 13,1 N-NH₄ - 0,4) | CaO - 16,7 | MgO - 6,0

ADOB Saletra wapniowa: N - 15,2 (N-NO₃ - 14,5 N-NH₄ - 0,7) | CaO - 27,5