

Czereśnia – program fertygacji ADOB®



pH roztworu w zakresie 5,5-6,5
EC: 1,0 - 1,6 mS/cm, zależnie od fazy wzrostu i przebiegu pogody
*Fertygacja 2-3 razy w tygodniu przy stężeniu 0,05% - 0,3% roztworu użytkowego

Dawka nawozu na tydzień*																
Zbiornik A	ADOB Ferti NK + ME 15-5-15	20 kg/ha	20 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha										10 kg/ha	10 kg/ha
	ADOB Ferti P + ME 4-40-13	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha								5 kg/ha	5 kg/ha		
	ADOB Ferti NPK 12-26-26					15 kg/ha	15 kg/ha									
	ADOB Ferti K + ME 10-6-39							20 kg/ha	20 kg/ha	20 kg/ha	25 kg/ha	25 kg/ha	25 kg/ha	20 kg/ha	20 kg/ha	
Zbiornik B	ADOB siarczan Magnezu	10 kg/ha	10 kg/ha							5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha			5 kg/ha	5 kg/ha
	ADOB Calmag			5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha				5 kg/ha	5 kg/ha		
	ADOB Saletra wapniowa					5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha				
Faza rozwojowa																
		pękanie pąków	zielony pąk	różowy pąk	kwitnienie			do czerwcowego opadu zawiązków				rozwój owoców		rozwój owoców		
BBCH		53	55	57-59	60-69	72-79						87		91		
Tydzień od początku wegetacji		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Zbiornik A : ADOB Ferti, Siarczan magnezu | **Zbiornik B** : Saletra wapniowa, Calmag
Nie należy mieszać nawozów w zbiorniku **A** z nawozami ze zbiornika **B** w jednym zabiegu

Dawki orientacyjne, należy dostosować do zasobności gleby, przebiegu pogody i odmiany

ADOB Siarczan magnezu: MgO - 16 | SO₃ - 32,5

ADOB Calmag: N - 13,5 (N-NO₃ - 13,1 N-NH₄ - 0,4) | CaO - 16,7 | MgO - 6,0

ADOB Saletra wapniowa: N - 15,2 (N-NO₃ - 14,5 N-NH₄ - 0,7) | CaO - 27,5