


Truskawka – program fertygacji ADOB®



pH roztworu w zakresie 5,5-6,2
EC: 0,0-1,8 mS/cm, zależnie od fazy i przebiegu pogody
*Fertygacja 2-3 razy w tygodniu przy stężeniu 0,05% - 0,3% roztworu użytkowego

Dawka nawozu na tydzień*																			
Zbiornik A	ADOB Ferti NK + ME 15-5-15	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha										10 kg/ha			10 kg/ha	10 kg/ha
	ADOB Ferti P + ME 4-40-13	5 kg/ha	5 kg/ha						10 kg/ha						5 kg/ha			5 kg/ha	5 kg/ha
	ADOB Ferti NPK 12-26-26					15 kg/ha			5 kg/ha	15 kg/ha									
	ADOB Ferti K + ME 10-6-39						20 kg/ha	20 kg/ha	20 kg/ha			20 kg/ha	20 kg/ha	20 kg/ha		15 kg/ha	15 kg/ha		
	ADOB siarczan Magnezu	10 kg/ha	10 kg/ha						5 kg/ha	5 kg/ha									
Zbiornik B	ADOB Calmag			5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	
	ADOB Saletra wapniowa			5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha			5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	5 kg/ha	
Faza rozwojowa																			
		start wegetacji	rozwój kwiatostanów			kwitnienie i rozwój owoców			zbiór owoców			po zbiorze owoców							
BBCH		11-13	55-59				60-72				85-89				91-92				
Tydzień od początku wegetacji		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Zbiornik A : ADOB Ferti, Siarczan magnezu | **Zbiornik B** : Saletra wapniowa, Calmag
Nie należy mieszać nawozów w zbiorniku **A** z nawozami ze zbiornika **B** w jednym zabiegu

Dawki orientacyjne, należy dostosować do zasobności gleby, przebiegu pogody i odmiany

ADOB Siarczan magnezu: MgO - 16 | SO₃ - 32,5

ADOB Calmag: N - 13,5 (N-NO₃ - 13,1 N-NH₄ - 0,4) | CaO - 16,7 | MgO - 6,0

ADOB Saletra wapniowa: N - 15,2 (N-NO₃ - 14,5 N-NH₄ - 0,7) | CaO - 27,5